

UNE ORCHIDÉE NOUVELLE DE MADAGASCAR

Par A. GUILLAUMIN

Lissochilus (s. g. *Eulophidium*) **Hebdingianus** Guillaum. sp. nov.

Pseudobulbi 3-5, cylindrici, 4-6 cm alti, virides, 1- foliati, radicibus carnosis, 20-30 cm longis, 15 mm diam., foliis erectis, linearibus (60-80 cm × 1,8-2,2 cm), 2-3 mm crassis, acute acuminatis, cinereo viridibus, longitudinaliter tenuissime striatis, viride maculatis punctatisque. Inflorescentia gracilis, nutans, laxissima, 1,30-1,40 mm longa, ± 70 flora, ramis 10-15 cm longis, circa 3- floris, ut rachi brunneo roseis intensius punctatis, pedicello 2,5-3 cm longo, bracteis anguste spatulato lanceolatis, 3 mm longis, floribus 3 em latis, sepalis lanceolatis (15 mm × 4 mm), basin versus longe attenuatis, apice acutis, brunneo luteis, petalis lanceolatis (11 mm × 3 mm), basin versus brevius attenuatis, apice acutis, brunneo luteo lobis basilaribus rubro striatis, centrale albis, 1,5 cm lato, 4- lobo, lobis rotundatis, basilaribus erectis, 5 mm longis, basi calcarem conicum, 3 mm longum, apice rotundatum formantibus, terminalibus leviter majoribus, reflexis, callo roseo, basi 2- cornuto antice costis 2 desinente, columna 3 mm longa, dilatata, viridi, antherae operculo fere quadrato, pollinibus globosis, caudiculo filiformi, retractili, retinaculo cornuato.

Madagascar : sous bois d'Anipanihy (très rare) (MONTAGNAC) 9/v/1957 ; a fleuri chez M. MARNIER-LAPOSTOLLE, aux Cèdres, à Saint-Jean-Cap-Ferrat en juin 1963. Type au Muséum de Paris.

A rapprocher de *L. ambongensis* Perr. de la Bât. mais pseudobulbes non tétragones, inflorescence lâchement ramifiée, sépales et pétales lancéolés, aigus au sommet.